



Fabrica y Distribuye:

proquimur

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL IPCS/OMS, 2009.

ANTÍDOTOS: Sulfato de atropina 1 por mil (10/00)

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión: provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. **Contacto con la piel:** Lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volverlas a usar. **Contacto con los ojos:** Lavado a chorro con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. **En caso de inhalación:** retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.

En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono (2) 1722 y concurrir al médico llevando esta etiqueta y el envase o folleto acompañante.

PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Usar guantes, botas, máscara, lentes y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A ORGANISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEJAS: No aplicar sobre cursos de agua y evitar la deriva a los mismos. No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación.

Toxicidad para aves: LIGERAMENTE TÓXICO.

Toxicidad para peces: MUJY TÓXICO.

Toxicidad para abejas: ALTAMENTE TÓXICO. Por su modo de aplicación controlada, no presenta daños a organismos acuáticos, peces, aves y abejas.

“Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar.”

Escurrimiento desde áreas tratadas con este producto hacia fuentes de agua adyacentes resultan peligrosos para peces.

En caso de derrame contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua.

DISPOSICIÓN FINAL DE ENVASES: Una vez vaciado el contenido del envase haga el “Triple Lavado” del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su re-utilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique “Cuidado-veneno” (calavera).

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES DOMÉSTICOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEF: (2) 1722”.

“CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE”.

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS O VESTIMENTAS”.

“NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”.

“PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS INDICADOS EN LA ETIQUETA”.

Nº LOTE:
Fecha de
Fabricación:
Fecha de
Vencimiento:

VER EN EL ENVASE

INSECTICIDA

Mercaptotion 5% POLVO

POLVO

USO AGRÍCOLA

Nombre común del
ingrediente activo (ISO)

Porcentaje en peso
(% p/p)

MALATION 5

Grupo químico: **ORGANOFOSFORADO**

Venta autorizada por el M.G.A.P. | Registro: 868

LEA ATENTAMENTE
LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO



CONTENIDO
NETO: **1 kg**
INDUSTRIA URUGUAYA

V01

INSECTICIDA

Mercaptotion 5% POLVO

POLVO

RECOMENDACIONES DE USO:

GENERALIDADES, MODO DE ACCIÓN SOBRE LA PLAGA O EL CULTIVO: MERCAPTOTION 5% POLVO es un insecticida fosforado, que actúa por contacto sobre hormigas e insectos que atacan granos almacenados.

INSTRUCCIONES DE USO				
CULTIVO O SITIO DE APLICACIÓN	PLAGA		DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		
FRUTALES HORTÍCOLAS FORESTALES FORRAJEROS ÁREAS CULTIVADAS	Hormiga cortadora colorada	<i>Acromyrmex heyeri</i>	50-150 gramos por hormiguero	Puede ser aplicado en cualquier momento en el que se observen las hormigas.
	Hormiga cortadora común	<i>Acromyrmex lundii</i>		
	Hormiga minera	<i>Atta sexdens piriventris</i>		
	Isaú	<i>Atta vollenweideri</i>		
GRANOS ALMACENADOS	Taladrillo de los granos	<i>Rhyzopertha dominica</i>	200 gramos por tonelada de grano	Aplicar una sola vez
	Gorgojo del trigo	<i>Sitophilus granarius</i>		
	Gorgojo de los granos almacenados	<i>Sitophilus oryzae</i>		
	Gusano amarillo de la harina	<i>Tenebrio molitor</i>		
	Tribolio confuso de la harina	<i>Tribolium confusum</i>		
	Polilla de los cereales	<i>Sitotroga cerealella</i>		
	Carcoma grande	<i>Tenebroides mauritanicus</i>		
Polilla de la fruta seca	<i>Plodia interpunctella</i>			

MOMENTO(S) DE APLICACIÓN: Para cada combinación: Ver cuadro de plagas.

NÚMERO, FRECUENCIA, Ó ESPACIAMIENTO DE APLICACIONES SI CORRESPONDE: En áreas cultivadas puede repetirse el tratamiento hasta el control final del hormiguero.

En granos almacenados realizar una sola aplicación.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Se aplica solo. No debe ser aplicado sobre las plantas.

TIEMPO DE ESPERA: Granos almacenados: 60 días. Para los cultivos: No corresponde por su modo de uso.

TIEMPO DE REINGRESO AL CULTIVO: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

OTRAS INFORMACIONES NECESARIAS RESPECTO AL USO

MODO DE PREPARACIÓN Y TÉCNICA DE APLICACIÓN: Se aplica directamente sin diluir. Utilizar preferentemente máquinas espolvoreadoras, tratando que el MERCAPTOTION 5% POLVO penetre al interior del hormiguero y llegue hasta la honguera. Para el control de plagas en granos almacenados, espolvorear directamente sobre las semillas a almacenar o en cada camada de las bolsas al hacer las estibas.

Firma registrante: PROQUIMUR S.A.

Ruta 5 km 35,300.
Juanicó, Canelones, Uruguay.
Tel. 4335 9662.

Fabrica y Distribuye: PROQUIMUR S.A.

Ruta 5 Km 35,300 Juanicó, Canelones, Uruguay.
Tel.: (+598) 4335 9662
administracionjuanico@proquimur.com.uy
www.proquimur.com.uy

NOTA: Como el uso, manejo y almacenamiento de este producto, se realiza fuera del control de esta firma, ésta no se hace responsable por daños y perjuicios que puedan derivarse del empleo o almacenamiento de este material. Quedando por entendido, que el comprador ha aceptado estas condiciones.



CUIDADO

