

HERBICIDA

STARON-R FLO38

SUSPENSIÓN CONCENTRADA

Ingrediente activo (ISO)	Porcentaje en peso (% p/p)	Contenido en volumen (g/l)
OXADIAZOL	34	380

Grupo químico: **OXADIAZOL**
 Venta autorizada por el M.G.A.P. I Registro: 2975
USO AGRÍCOLA.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL IPCS/OMS, 2006.
ANTÍDOTOS: No tiene antídoto.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, **NO** provocar el vómito. En caso de contacto con la piel, lavar las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. En caso de contacto con los ojos, lavar a chorro con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".
"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEF: (2)1722".
"CONCURRED AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE".
"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".
"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".
"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".

FIRMA REGISTRANTE:
INEPLUS S.A.
 Treinta y Tres 631
 Canelones, Uruguay.
 Teléfono: 4332 8438
 Fax: 4332 3085

NOMBRE DEL FABRICANTE:
PROQUIMUR S.A.
 Ruta 5 Km 35,300 Juanicó, Canelones, Uruguay.
 Tel.: (+598) 4335 9662
 administracionjuanico@proquimur.com.uy
 www.proquimur.com.uy

CONTENIDO NETO:
 Ver en el envase.
ORIGEN: URUGUAY
 Nº LOTE:
 Fecha de Fabricación:
 Fecha de Vencimiento:



CUIDADO

1002

PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar, durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A ORGANISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEJAS: Toxicidad para aves, ligeramente tóxico. Toxicidad para peces, moderadamente tóxico. Toxicidad para abejas, virtualmente no tóxico.

DISPOSICIÓN FINAL DE ENVASES: Una vez vaciado el contenido del envase, realice el triple lavado del mismo, vertiendo el agua del lavado en la máquina aplicadora. Luego perfore el envase para impedir su reutilización.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Guardar el

producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con llave y alejado del alcance de los niños. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia.

ESTE PRODUCTO NO SE DEBE TRANSVASAR A RECIPIENTES GALVANIZADOS, PORQUE SE VUELVE INFLAMABLE.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".
"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEF: (2) 1722".
"CONCURRED AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE".
"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".
"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".
"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".

RECOMENDACIONES DE USO:

GENERALIDADES, MODO DE ACCIÓN SOBRE LA PLAGA O EL CULTIVO:
STARON-R-FLO 38 es un herbicida de aplicación pre-emergente y post-emergente, selectivo a los cultivos de ajo y cebolla, y activo sobre malezas anuales tanto de gramíneas como de hoja ancha. El mecanismo de acción es la inhibición de la protoporfirógeno oxidasa, teniendo acción sobre las membranas celulares afectando su organización, permeabilidad y transporte de electrones.

INSTRUCCIONES DE USO				
CULTIVO	MALEZAS		DOSIS	OBSERVACIONES
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		
AJO Y CEBOLLA	Ray grass	<i>Lolium sp</i>	2 L/ha	En AJO aplicar en pre o post emergencia del cultivo. En CEBOLLA aplicar desde los 7 días del trasplante.
	Pastito de invierno	<i>Poa annua</i>		
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>		
	Rábano	<i>Raphanus raphanistrum</i>		
	Mostacilla	<i>Rapistrum rugosum</i>		
	Manzanilla	<i>Matricaria chamomilla</i>		
	Mastuerzo	<i>Coronopus didymus</i>		
	Capiquí	<i>Stellaria media</i>		
ARROZ	Bolsa de pastor	<i>Capsella bursa pastoris</i>	2,5 L/ha	Preemergencia del cultivo y las malezas

NÚMERO, FRECUENCIA O ESPACIAMIENTO DE APLICACIONES: Generalmente una sola aplicación por temporada de cultivo.
CONTRAINDICACIONES: Las semillas de arroz se deben sembrar a una profundidad homogénea, no menor a 2,5 cm, bien cubiertas por el suelo para que no entren en contacto directo con el herbicida.
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Como el **STARON-R FLO 38** puede ser aplicado con otros fitosanitarios. En caso de mezclar con otros productos y no tener la certeza del comportamiento tanto físico como biológico de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.
TIEMPO DE ESPERA: Para ajo y cebolla 120 días y para arroz no es necesario porque se aplica en presembrado.

TIEMPO DE REINGRESO MÍNIMO: No ingresar al área tratada, hasta que la pulverización haya secado completamente, dejando como mínimo transcurrir 24 h.

OTRAS INFORMACIONES NECESARIAS RESPECTO AL USO PREVENCIÓN DE RESISTENCIA: SE RECOMIENDA ROTAR O COMBINAR CON OTROS HERBICIDAS DE DIFERENTE MODO DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA DE MALEZAS SIN CONTROLAR, INVESTIGANDO LA CAUSA DE SU PERMANENCIA, ELIMINANDOLA PARA QUE NO SE PROPAGUE.

MODO DE PREPARACIÓN Y TÉCNICA DE APLICACIÓN:
PREPARACIÓN: Agregar directamente la cantidad necesaria de **STARON-R FLO 38** en el tanque del equipo a medio llenar. Completar el volumen del tanque, haciendo funcionar el sistema de retorno. No efectuar el llenado con agua de las maquinarias de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.
MÉTODO DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar con equipos pulverizadores terrestres calibrando la máquina para un gasto entre 100-150 litros/ha, y con boquillas de abanico plano trabajando a una presión entre 25 y 40 lbs/p².
No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y del límite de instituciones educativas.
No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y del límite de instituciones educativas.
No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares)
No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

NOTA: Como el uso, manejo y almacenamiento de este producto, se realiza fuera del control de esta firma, ésta no se hace responsable por daños y perjuicios que puedan derivarse del empleo o almacenamiento de este material. Quedando por entendido, que el comprador ha aceptado estas condiciones.