

TAURUS SLTS / PANTONE BLACK PANTONE 361c PANTONE 347 C

MEDIDAS: 13x12,5cm

**RECOMENDACIONES DE USO:**

**GENERALIDADES, MODO DE ACCIÓN SOBRE LA PLAGA O EL CULTIVO:** Taurus es un herbicida post emergente sistémico para el control de malezas de hoja ancha. Tiene acción hormonal y es selectivo para trigo, cebada, colza, maíz y sorgo. Es absorbido por el follaje, tallo y raíces de las malezas. Actúa produciendo alteración en el balance hormonal y en la síntesis proteica, provocando detención del crecimiento, necrosis y otras alteraciones en el desarrollo de las malezas.

INSTRUCCIONES DE USO				
CULTIVO	MALEZAS		DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		
TRIGO	Abrojo grande	<i>Xanthium cavanillesii</i>	75 – 100 cc/Ha	Aplicar desde el comienzo del macollaje hasta el comienzo del encañado. Las malezas deben ser pequeñas, aplicar en estado de roseta, antes de la elongación del vástago. +2,4 D 48% (Gamina) 750 cc/ha
	Anagallis	<i>Anagallis arvensis</i>		
	Capiquí	<i>Stellaria media</i>		
	Cardo pendiente	<i>Carduus nutans</i>		
CEBADA	Cardo negro	<i>Cirsium vulgare</i>		
	Cornihuela	<i>Convolvulus arvensis</i>		
	Cicutilla negra	<i>Ammi majus</i>		
	Chamico	<i>Datura ferox</i>		
	Chinchilla	<i>Tagetes minuta</i>		
	Enredadera anual	<i>Polygonum convolvulus</i>		
MAÍZ	Flor Morada	<i>Echium plantagineum</i>	100 – 120 cc/Ha	Aplicar desde que el cultivo tiene 2 hojas hasta 6 hojas. Las malezas deben ser pequeñas y estar en activo crecimiento, aplicar en estado de roseta, antes de la elongación del vástago. + 2,4 D 48% (Gamina) 750 cc/ha
	Gambarrusa	<i>Alternanthera philoxeroides</i>		
	Quinoa	<i>Chenopodium sp.</i>		
	Lengua de vaca	<i>Rumex crispus</i>		
	Manzanilla	<i>Matricaria chamomilla</i>		
SORGO	Mostacilla	<i>Rapistrum rugosum</i>		
	Sanguinaria	<i>Polygonum aviculare</i>		
	Senecio	<i>Senecio madagascariensis</i>		
	Viznaga	<i>Ammi visnaga</i>		
	Yuyo colorado	<i>Amaranthus spp.</i>		

**PREVENCIÓN DE RESISTENCIA:**

SE RECOMIENDA ROTAR CON OTROS HERBICIDAS DE DIFERENTE MECANISMO DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA DE MALEZAS SIN CONTROLAR, INVESTIGANDO LA CAUSA DE SU PERMANENCIA. ELIMINE LAS MALEZAS SOBREVIVIENTES PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN.

**NÚMERO, FRECUENCIA, O ESPACIAMIENTO DE APLICACIONES SI CORRESPONDE:** Se recomienda realizar una aplicación por temporada.

**COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:** Es compatible con Gamina (2,4 D). En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, la efectividad agronómica o la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba en pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo. No es fitotóxico a las dosis y momentos de desarrollo del cultivo recomendado en la etiqueta.

**TIEMPO DE ESPERA:** para cereales 45 días. Dejar transcurrir 21 días entre la aplicación y el pastoreo. En caso de rotar con cultivos sensibles como Girasol, Soja, Papa, Hortalizas y otras leguminosas, se debe esperar al menos 70 días desde la aplicación a la implantación del cultivo.

**TIEMPO DE REINGRESO AL CULTIVO:** No reingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado dejando transcurrir al menos 24 hs.

**MODO DE PREPARACIÓN Y TÉCNICA DE APLICACIÓN:** Se aplica diluido en agua. Agregar la cantidad calculada del producto al tanque del equipo aplicador a medio llenar, con el sistema de agitación en funcionamiento y completar luego el tanque con agua. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. **Se recomienda** aplicar con equipos pulverizadores terrestres capaces de lograr 30 a 40 gotas/cm<sup>2</sup> calibrando la máquina con un gasto entre 80-120 litros/Ha, y con boquillas de abanico plano trabajando a una presión entre 25 y 40 lbs/pulg<sup>2</sup>. **No realizar aplicaciones aéreas** a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y del límite de instituciones educativas. **No realizar aplicaciones terrestres** mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y del límite de instituciones educativas. **No realizar aplicaciones aéreas** en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). **No realizar aplicaciones terrestres** con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

**NOTA:** Como el uso, manejo y almacenamiento de este producto, se realiza fuera del control de esta firma, ésta no se hace responsable por daños y perjuicios que puedan derivarse del empleo o almacenamiento de este material. Quedando por entendido, que el comprador ha aceptado estas condiciones.



HERBICIDA

# Taurus

**CONCENTRADO SOLUBLE**

Ingrediente activo (ISO)	Porcentaje en peso (% p/p)	Contenido en volumen (g/l)
SAL POTÁSICA DE PCLORAM	24	278
EQUIVALENTE EN PCLORAM	20,7	240

Grupo químico: **ÁCIDO PIRIDIOXIACÉTICO**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**  
**CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA:** POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL. ICS/OMS 2009  
**ANTIDOTOS:** No tiene antídoto.

**PRIMERS AUXILIOS:** En caso de ingestión **NO** inducir el vómito. En caso de contacto con la piel lavado de las partes afectadas con abundante agua. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de usarlas. En caso de contacto con los ojos, lavado con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

En todos los casos consultar al médico llevando el envase y/o la etiqueta del producto. En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono (2) 1722.

**PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS:** Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar, durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No destapar los plcos de la pulverizadora con la boca.

**EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO:** Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

**ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A ORGANISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEJAS:** No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No contaminar

Venta autorizada por el M.G.A.P.

Registro: 4459

**USO AGRÍCOLA  
 LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA  
 ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación.  
 Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico.  
 Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.  
 Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico.  
**DISPOSICIÓN FINAL DE ENVASES:** Una vez vaciado el contenido del envase, realice el triple lavado del mismo, vertiendo el agua del lavado en la máquina aplicadora. Luego realice el triple lavado para su reutilización y lívelo al centro de acopio más cercano.  
**INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:** Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno" (calavera). En caso de derrame recoger con tierra y/o aserrín para absorción de la sustancia, luego de juntarla, tirarla en el lugar de aplicación, lejos de fuentes de agua y/o probable contaminación de otros cultivos.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".  
 "EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TEL: (2) 1722".  
 "CONCURRER AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE".  
 "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".  
 "NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".  
 "LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".

FIRMA REGISTRANTE:

**PROQUIMUR S.A.**

Ruta 5 Km 35,300 Juanicó, Canelones, Uruguay.

Tel.: (+598) 4335 9662 - FAX: 4335 9775

administracionjuanico@proquimur.com.uy

www.proquimur.com.uy

**ORIGEN: CHINA**

**NOMBRE DEL FABRICANTE:**

Sinochem Ningbo Ltd.

DISTRIBUYE:

Proquimur S.A.

Nº LOTE:

Fecha de

Fabricación:

Fecha de

Vencimiento:

VER EN EL  
 HOMBRO  
 DEL ENVASE

CONTENIDO  
 NETO: **5 Litros** V01



**CUIDADO**

