

RECOMENDACIONES DE USO GENERALIDADES, MODO DE ACCIÓN SOBRE LA PLAGA O EL CULTIVO: Es un herbicida hormonal, sistémico de post emergencia para el control de malezas latifolias. Presenta absorción foliar y radical, se transloca rápidamente en la planta y actúa mimetizador de auxina afectando el crecimiento de las malezas.

INSTRUCCIONES DE USO:			
Cultivo	MALEZA		Dosis
	Nombre Común	Nombre Científico	
TRIGO, CEBADA, FALARIS FESTUCA, RAIGRAS	Abrojo grande	<i>Xanthium cavanillesii</i>	0.3 - 0.5 L/ha
	Anagallis	<i>Anagallis arvensis</i>	
	Calabacilla	<i>Silene gallica</i>	
ARROZ	Capiquí	<i>Stellaria media</i>	0.35 - 0.5 L/ha
CEBOLLA	Moco de oveja	<i>Cerastium glomeratum</i>	0.75 - 1 L/ha
	Chamico	<i>Datura ferox</i>	
	Biznaquilla	<i>Ammi majus</i>	
	Correhuela	<i>Convolvulus arvensis</i>	
CAMPO NATURAL	Enredadera anual	<i>Polygonum convolvulus</i>	0.25 - 0.3 L/ha
	Girasol guacho	<i>Helianthus annuus</i>	
	Lamium	<i>Lamium amplexicaule</i>	
	Lengua de vaca	<i>Rumex crispus</i>	
	Lotus	<i>Lotus spp.</i>	
	Trebol blanco	<i>Trifolium repens</i>	
BARBECHO QUÍMICO	Trebol rojo	<i>Trifolium pratense</i>	0.35 - 0.5 L/ha
	Mostacilla	<i>Rapistrum rugosum</i>	
	Nabo	<i>Brassica campestris</i>	
	Órtiga	<i>Urtica urens</i>	
	Pega pega	<i>Galium aparine</i>	
	Sanguinaria	<i>Polygonum aviculare</i>	
	Senecio	<i>Senecio grisebachii</i>	

PREVENCIÓN DE RESISTENCIA: SE RECOMIENDA ROTAR O COMBINAR CON OTROS HERBICIDAS DE DIFERENTE MECANISMOS DE ACCIÓN PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA DE MALEZAS SIN CONTROLAR, INVESTIGANDO LA CAUSA DE SU PERMANENCIA. ELIMINE LAS MALEZAS SOBREVIVIENTES PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN.

MOMENTO(S) DE APLICACIÓN: PARA CADA COMBINACIÓN: En trigo y cebada aplicar desde 3 hojas despegadas hasta el estado de hoja bandera.

Aplicar cuando las malezas se encuentran en activo crecimiento.

NÚMERO, FRECUENCIA O ESPACIAMIENTO DE APLICACIONES SI CORRESPONDE: Generalmente se realiza una aplicación por temporada.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Como se pueden realizar mezclas de tanque con otros agroquímicos, antes de aplicar con otros productos se debe realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala. No se debe aplicar en cultivos que estén en condiciones de estrés por temperaturas bajas, deficiencias hídricas, excesos de humedad o deficiencias nutricionales.

TIEMPO DE ESPERA: Trigo, Cebada, Arroz: 40 días. Falaris, Festuca, Raigras y campo natural para pastoreo: 21 días. Cebolla: 42 días
TIEMPO DE REINGRESO AL CULTIVO: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente, dejando como mínimo transcurrir 24 h.

MODO DE PREPARACIÓN Y TÉCNICA DE APLICACIÓN: Se aplica diluido en agua. Agregar la cantidad calculada del producto al tanque del equipo aplicador a medio llenar, con el sistema de agitación en funcionamiento y completar luego el tanque con agua. **No efectuar** el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. Puede ser aplicado con cualquier tipo de equipo terrestre o aéreo. **En aplicaciones terrestres** con equipos pulverizadores de barra utilizar boquillas tipo abanico plano, con un volumen de aplicación de 80-100 L/ha en cereales. **En aplicaciones aéreas** utilizar un volumen superior a 8 L/ha. **No realizar aplicaciones aéreas** a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. **No realizar aplicaciones terrestres** mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. **No realizar aplicaciones aéreas** en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). **No realizar aplicaciones terrestres** con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

NOTA: Como el uso, manejo y almacenamiento de este producto, se realiza fuera del control de esta firma, ésta no se hace responsable por daños y perjuicios que puedan derivarse del empleo o almacenamiento de este material. Quedando por entendido, que el comprador ha aceptado estas condiciones.



proquimur

V02

HERBICIDA

Maxipir

CONCENTRADO EMULSIONABLE

Ingrediente activo (ISO)	Porcentaje en peso (% p/p)	Contenido en volumen (g/l)
FLUROXIPIR-MEPTIL	29.7	288
FLUROXIPIR equivalente en ácido	20.6	200

Grupo químico: **ÁCIDO CARBOXÍLICO**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: Clase III (TRES). LIGERAMENTE PELIGROSO, IPCS/OMS, 2009.

ANTIDOTOS: No tiene antídoto.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión NO provocar el vómito. En caso de contacto con la piel, lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volverlas a usar. En caso de contacto con los ojos, lavado con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado. Consultar al C.I.A.T. (Hospital de clínicas, 7º piso) Teléfono (2) 1722.

PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar, durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A ORGANISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEJAS: No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.

No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación.

ECOTOXICOLÓGICA:

TOXICIDAD PARA AVES: PRACTICAMENTE NO TÓXICO.

TOXICIDAD PARA PECES: LIGERAMENTE TÓXICO. *TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES

Distribuye: **PROQUIMUR S.A.**
Ruta 5 Km 35,300 Juanicó, Canelones, Uruguay
Tel.: (+598) 4335 9662 - FAX: 4335 9775
administracionjuanico@proquimur.com.uy
www.proquimur.com.uy
Fabrica: Iprochem Co; Ltd.
ORIGEN: CHINA

FIRMA REGISTRANTE:
INEPLUS S.A.
Treinta y Tres 631
Canelones, Uruguay.
Teléfono: 4332 8438
Fax: 4332 3085

Nº LOTE:
Fecha de
Fabricación:
Fecha de
Vencimiento:

VER EN EL
HOMBRO
DEL ENVASE

CONTENIDO
NETO: **5 Litros**

Venta autorizada por el M.G.A.P.
Registro: 3986
**USO AGRÍCOLA
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

PARA EVITAR QUE EL PRODUCTO APLICADO Y SUS COMPUESTOS DE DEGRADACIÓN HAGAN CONTACTO EN AVES, ABEJAS, ORGANISMOS ACUÁTICOS Y/O PECES DEBIDO AL POSIBLE EFECTO ADVERSO QUE LES PUEDIERA OCASIONAR.

TOXICIDAD PARA ABEJAS: VIRTUALMENTE NO TÓXICO.

DISPOSICIÓN FINAL DE ENVASES: Una vez vaciado el contenido del envase, realice el triple lavado del mismo, vertiendo el agua del lavado en la máquina aplicadora. Luego perforo el envase para impedir su reutilización. Llévelo al centro de acopio más cercano.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro. El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes u otros similares. Debe estar claramente sellado con un cartel que indique "Cuidado-veneno (calavera)".

En caso de derrame recoger con tierra y/o aserrín para absorción de la sustancia, luego de juntarla, tirarla en el lugar de aplicación, lejos de fuentes de agua y/o probable contaminación de otros cultivos.

No almacene con alimentos, utensilios domésticos o vestimentas.

***MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS*.**

***EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEF: (2)1722. CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE*.**

***NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS*.**

***NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA*.**

***PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN ESTA ETIQUETA*.**



CUIDADO

200