PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: CLASE II (DOS) MODERADAMENTE PELIGROSO IPCS/OMS, 2009
ANTÍDOTOS: No tiene antídoto.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. **En caso de inhalación,** llevar al paciente a un lugar bien ventilado. **En caso de contacto con la piel,** sacar la ropa contaminada, lavar bien las partes del cuerpo afectadas con agua y jabón. La ropa contaminada debe lavarse muy bien antes de volverse a usar. **En caso de contacto con los ojos,** lavarlos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Nunca administrar nada por vía oral ni inducir el vómito a un paciente inconsciente y mantenerlo acostado de lado.
CONSULTAR AL CIAT (Hospital de Clínica, 7mo. Piso) Tel.: (2) 1722
PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar, durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A ORGANISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEJAS: No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación.
Ecotoxicología:
Toxicidad para aves, prácticamente no tóxico.
Toxicidad para peces, ligeramente tóxico.
Toxicidad para abejas, virtualmente no toxico.
"Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar."
DISPOSICIÓN FINAL DE ENVASES: Una vez vaciado el contenido del envase, realice el triple lavado del mismo, vertiendo el agua del lavado en la máquina aplicadora. Luego perfore el envase para impedir su reutilización. Traslade los envases al centro de acopio más cercano.
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique **"Cuidado-veneno"** (calavera). En caso de derrame recoger con tierra y/o aserrín para absorción de la sustancia, luego de juntarla, tirarla en el lugar de aplicación, lejos de fuentes de agua y/o probable contaminación de otros cultivos.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".
"EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: (2) 1722".
"CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE".
"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".
"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".
"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".

FIRMA REGISTRANTE: INEPLUS S.A.
Treinta y Tres 631. Ciudad de Canelones,
Departamento de Canelones, Uruguay.
Teléfono: 4332 8438. Fax: 4332 3085.

CONTENIDO NETO: 1 Litro

Nº LOTE:
Fecha de Fabricación:
Fecha de Vencimiento:
VER EN EL HOMBRO DEL ENVASE

NOTA: Como el uso, manejo y almacenamiento de este producto, se realiza fuera del control de esta firma, ésta no se hace responsable por daños y perjuicios que puedan derivarse del empleo o almacenamiento de este material. Quedando por entendido, que el comprador ha aceptado estas condiciones.

4088 04 01

HERBICIDA

Stop

CONCENTRADO SOLUBLE

Nombre común del ingrediente activo (ISO)	Porcentaje en peso (% p/p)	Contenido en volumen (g/l)
Glufosinato de Amonio	 18,4	 200

Grupo químico: **Fosfono aminoácidos**
Venta autorizada por el M.G.A.P. | Registro: 4088

USO AGRÍCOLA

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ORIGEN: CHINA

proquimur

1 Litro

NOMBRE DEL FABRICANTE:
Yongnong Bio Sciences Co., Ltd.

RECOMENDACIONES DE USO:
GENERALIDADES, MODO DE ACCIÓN SOBRE LA PLAGA O EL CULTIVO: STOP es un herbicida de contacto para el control de malezas gramíneas y de hojas anchas, anuales y perennes. Actúa inhibiendo la enzima glutaminosintetasa, produciendo alteración del metabolismo del amino, lo cual produce una acumulación de fitotoxina produciendo la muerte de las malezas.
Es un herbicida no selectivo, que puede ser utilizado en frutales, vid y citrus en aplicaciones dirigidas, en maíces transgénicos que poseen el evento de tolerancia al glufosinato de amonio, así como en barbechos y áreas no cultivadas.

CULTIVO	INSTRUCCIONES DE USO		DOSIS (L/Ha)	MOMENTO DE APLICACIÓN
	MALEZAS			
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		
Montes Frutales	Balango Pasto blanco Capín Raigrás	*Avena fatúa* *Digitaria sanguinalis* *Echinocloa crusgalli* *Lolium multiflorum*	1,5 a 5,0	Aplicar a malezas en activo crecimiento. Evitar derivas o mojamientos de troncos que aún estén verdes.
Viñedos	Pasto de invierno Cola de zorro Gramilla	*Poa annua* *Setaria spp.* *Cynodon dactylon*	1,5 a 5,0	Aplicar a malezas en activo crecimiento. Evitar derivas o mojamientos de troncos que aún estén verdes.
Áreas no cultivadas	Pasto miel Sorgo de alepo Yuyo colorado	*Paspalum distichum* *Sorghum halepense* *Amaranthus spp.*	2,0 a 7,5	Aplicar a las malezas en activo crecimiento.
Papa	Manzanilla Flor de pajarito Enredadera Verdolaga Nabón	*Anthemis spp.* *Fumaria officinalis* *Polygonum convolvulus* *Portulaca oleracea* *Raphanus spp.*	2,0 a 3,0	Como desecante, al comenzar la senescencia del cultivo. No aplicar sobre aquellos cultivos destinados a semilla.
Citrus	Capiquí Corriguela Lengua de vaca Trébol blanco	*Stellaria media* *Convulvulus arvensis* *Rumex crispus* *Trifolium repens*	1,5 a 5,0	Aplicar a malezas en activo crecimiento. Evitar derivas o mojamientos de troncos que aún estén verdes.

PREVENCIÓN DE RESISTENCIA:
SE RECOMIENDA ROTAR O COMBINAR CON OTROS HERBICIDAS DE DIFERENTE MECANISMO DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRIENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA DE MALEZAS SIN CONTROLAR, INVESTIGANDO LA CAUSA DE SU PERMANENCIA. ELIMINAR LAS MALEZAS SOBREVIVIENTES PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN.
NÚMERO, FRECUENCIA O ESPACIAMIENTO DE APLICACIONES: Se realiza una sola aplicación por temporada.
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.
IMPORTANTE: No debe ser aplicado en papa en cultivos que van a ser destinados a semilla.
TIEMPO DE ESPERA: No corresponde por el momento en el cual se aplica.
TIEMPO DE REINGRESO AL CULTIVO: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente, dejando como mínimo transcurrir 24 h.
MODO DE PREPARACIÓN Y TÉCNICA DE APLICACIÓN: Se aplica diluido en agua. Agregar la cantidad calculada del producto al tanque del equipo aplicador a medio llenar, con el sistema de agitación en funcionamiento y completar luego el tanque con agua. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. Puede ser aplicado con cualquier tipo de equipo terrestre. En aplicaciones realizadas en frutales, vid y citrus se recomienda realizar aplicaciones terrestres dirigidas, utilizando pantallas protectoras y aplicando solamente en la entrefina ya que no es un herbicida selectivo. El gasto de agua debe ser de entre 80 y 100 L/ha. Utilizar boquillas de abanico plano y una presión entre 40 y 60 lbs/pulg2. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosos y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana, centro poblado y centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

proquimur

NOCIVO