

## RECOMENDACIONES DE USO:

**GENERALIDADES, MODO DE ACCIÓN SOBRE LA PLAGA O EL CULTIVO:** Zoraz 45 CE es un fungicida de amplio espectro, que actúa en forma preventiva y curativa.

INSTRUCCIONES DE USO				
CULTIVO	MALEZAS		DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		
ARROZ	Mancha lineal	<i>Cercospora oryzae</i>	0.5 Lt/ha + 0.5 L de Prozim SC (carbendazim)	Aplicar a partir de la emergencia de la panoja repitiendo 15 días después
	Podredumbre del tallo	<i>Sclerotium oryzae</i>		
CEBADA	Mancha en red	<i>Drechslera teres</i>	1 Lt/ha	Aplicar cuando se dan las condiciones predisponentes para la enfermedad. Repitiendo 15 días después.
TRIGO	Septoriosis	<i>Septoria tritici</i>	1 Lt/ha	Aplicar preventivamente o con las apariciones de los primeros síntomas. Para golpe blanco aplicar desde comienzo de espigazón a fin de floración en especial durante la apertura de las anteras.
	Golpe blanco	<i>Fusarium graminearum</i>		
	Mancha marrón	<i>Bipolaris sorokiniana</i>		
	Mancha amarilla	<i>Drechslera tritici repentis</i>		
CITRUS	Moho verde	<i>Penicillium digitatum</i>	150 a 270 cc / 100 Lt agua	Aplicar en Drencher o en la línea de empaque, duración del baño: 1 minuto
	Moho azul	<i>Penicillium italicum</i>		

**MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** ver cuadro.

**COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:** Aplicar solo.

**TIEMPO DE ESPERA:** Arroz, Cebada, Trigo: 55 días. En caso que el cultivo o sus subproductos estén destinados a la exportación deberán tenerse en cuenta los Límite Máximo de Residuos (LMR) del país de destino y el tiempo de espera que corresponda a ese valor de tolerancia.

**TIEMPO DE REINGRESO AL CULTIVO:** 24 horas o después que haya secado el caldo de aplicación.

**OTRAS INFORMACIONES NECESARIAS RESPECTO AL USO:**

Alternar o combinar la aplicación de este producto con fungicidas de diferente modo de acción, pueden evitar o demorar la aparición o el desarrollo de resistencia. Limitar el número de aplicaciones a no más de 2 a 3 aplicaciones por temporada.

**MODO DE PREPARACIÓN Y TÉCNICA DE APLICACIÓN:** Se aplica en dilución con agua limpia. Puede aplicarse con todo tipo de pulverizadores terrestres o aéreos.

Agregar directamente la cantidad necesaria de Zoraz 45 CE en el tanque del equipo a medio llenar. Completar el volumen del tanque, haciendo funcionar el sistema de retorno. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.

Se recomienda aplicar con equipos pulverizadores terrestres con un gasto entre 100-150 litros por hectárea y con equipos aéreos, con un mínimo de 40 litros por hectárea. En citrus se puede aplicar en los Drencher o en la línea de empaque.

No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de centros educativos.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de centros educativos.

No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).

No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

**NOTA:** Como el uso, manejo y almacenamiento de este producto, se realiza fuera del control de esta firma, ésta no se hace responsable por daños y perjuicios que puedan derivarse del empleo o almacenamiento de este material. Quedando por entendido, que el comprador ha aceptado estas condiciones.



2985 05 02

## FUNGICIDA

# Zoraz45 CE

### CONCENTRADO EMULSIONABLE

Ingrediente activo (ISO)      Porcentaje en peso (% p/p)      Contenido en volumen (g/l)

PROCLORAZ ..... 42,45 ..... 450

Grupo químico: IMIDAZOL

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

**CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA:** CLASE II (dos), MODERADAMENTE PELIGROSO. #PCS/DMS, 2008

**ANTIDOTOS:** no tiene.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión NO provocar el vómito. En caso de contacto con la piel, lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.

**PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS:** Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

**EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO:** Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

**ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A ORGANISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEJAS:** Producto poco tóxico para aves,

moderadamente tóxico para peces y poco tóxico para abejas. Derivas o escurrimientos desde áreas tratadas con este producto hacia fuentes de agua adyacentes podrían resultar peligrosos para peces.

**DISPOSICIÓN FINAL DE ENVASES:** Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfere el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.

**INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:** Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, protegido de la luz solar directa, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros productos similares. El local debe estar claramente señalizado.

**"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".**

**"EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: (2) 1722".**

**"CONCURREDIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE".**

**"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".**

**"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".**

**"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".**

**"PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA".**

NOMBRE DEL FABRICANTE O FORMULADOR:

PROQUIMUR S.A.

Ruta 5 Km 35,300 Juanicó, Canelones, Uruguay

Tel.: (+598) 4335 9662 - FAX: 4335 9775

administracionjuanico@proquimur.com.uy

www.proquimur.com.uy

FIRMA REGISTRANTE:

INEPLUS S.A.

Treinta y Tres 631

Canelones, Uruguay.

Tel.: 433 28438

Fax: 433 23085

Nº LOTE:

Fecha de

Fabricación:

Fecha de

Vencimiento:

VER EN EL HOMBRO DEL ENVASE

**ORIGEN: URUGUAY**

CONTENIDO

NETO:

**5 Litros**

2985 05 02



**NOCIVO**

