

INSECTICIDA - ACARICIDA
GRUPO 6

VIGIA

CONCENTRADO EMULSIONABLE

Composición:

abamectina:	> ó = 80% avermectina B1a: (5-0-demetil avermectina A1a) y < ó = 20% avermectina B1b: (5-0-demetil- 25-de(1-metilpropil)-25-(1-metiletil) avermectina A1a	1,8 g
coadyuvantes c.s.p		100cm³

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscripto en SENASA Nº 34.404

Registrado por:



PROQUIMUR S.A.
Rivadavia 789
(1002) CAPITAL FEDERAL
ORIGEN: URUGUAY
INFLAMABLE DE 3ª CATEGORIA

Formulador:
PROQUIMUR S.A.

Ruta 5 Km 35,300 Juanicó,
Canelones, Uruguay.

Lote N°:
Fecha de
Vencimiento:

VER EN
EL HOMBRO
DEL ENVASE

Contenido Neto:

1 Litro

V01



CUIDADO



ABRIR
AQUI

GENERALIDADES: insecticida - acaricida de origen natural, de largo efecto residual y altamente efectivo en el control de ácaros, larvas minadoras, moscas blancas, trips, en una variedad de cultivos entre ellos pomáceas, citrus, frutillas, tomates y ornamentales. Actúa por contacto e ingestión, con acción secundaria translinar. Aunque los ácaros e insectos no mueren en forma inmediata, estos dejan de causar daño después de la aplicación de VIGIA.

No aplicar en horas de calor y dirigir la aplicación al follaje.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

PREPARACIÓN: Llenar el tanque del equipo aplicador hasta la mitad de su capacidad con agua, agregue la dosis requerida de VIGIA, y complete con agua hasta el volumen deseado, manteniendo siempre el agitador en marcha. En caso de usar con aceite, agregue este a la mezcla previamente diluida en agua.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: VIGIA puede ser aplicado tanto con equipos terrestres manuales o motorizados, como aéreos de alto y bajo volumen. Lograr una buena cobertura de aplicación pero evitando el escurrimiento.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS		MOMENTO DE APLICACIÓN
		Cada 100 litros de agua	Por Hectárea	
ALGODÓN	Oruga de la hoja (Alabama argillacea)		300 - 600 cc/ha	Aplicar cuando se determine la presencia de 50 o más orugas en 100 golpes de red de arrastre. Controlar las larvas en su primer estado de desarrollo.
	Arañuela roja común (Tetranychus urticae)			Iniciar las pulverizaciones al notar la presencia de las primeras arañas o los primeros síntomas del ataque de ácaros. Repetir cuando ocurran reinfestaciones.
MANZANA	Arañuela roja común (Tetranychus sp.) Arañuela roja europea (Panonychus ulmi)	40 cc/hl de agua + 0.5 % de aceite mineral de verano	750 - 1500 cc/ha de acuerdo al volumen de agua a asperjar	Aplicar desde la caída de los pétalos hasta 4 semanas después.
TOMATE	Acaro del bronceado (Aculops lycopersici)	60 - 70 cc/hl		Aplicar al notar la presencia de las primeras arañas o los primeros síntomas del ataque de ácaros con alto volumen de agua y alta presión. Evitar el escurrimiento. Repetir cuando ocurran reinfestaciones. No aplicar más de 4,8 litros de producto por ciclo de cultivo.
	Arañuela roja común (Tetranychus urticae)	50 - 70 cc/hl		
	Polilla del tomate (Tuta absoluta)	80 - 100 cc/hl + 0,25 % aceite mineral de verano	500 - 1200 cc/ha de acuerdo al volumen de agua a asperjar	
APIO PEPINO MELÓN SANDÍA	Arañuela roja común (Tetranychus urticae)	80 cc/hl	600 - 1200 cc/ha de acuerdo al volumen de agua a asperjar.	Aplicar a los primeros indicios de infestación, en alto volumen de agua, alta presión logrando una buena cobertura de todo el cultivo. Evitar el escurrimiento. Repita la aplicación cuando sea necesario. No realizar más de 4 aplicaciones por ciclo de cultivo
	Gusanos minadores (Liriomyza sp.)			Aplicar cuando vea por primera vez las galerías o a sus picaduras y repita cada siete días, cuando sea necesario, para mantener el control. Asperje con alto volumen de agua y alta presión para obtener una cobertura total del follaje. No realizar más de 4 aplicaciones por ciclo de cultivo

PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.

- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

- INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.

- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.

- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.

- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar el contacto del producto con la piel y los ojos. Durante su aplicación no comer, beber o fumar. Después de la misma lavarse bien las manos y partes del cuerpo expuestas al producto con agua y jabón. No contaminar agua, comida o alimentos en el almacenaje o transporte. Usar lentes protectores para la vista, ropa de mangas largas, guantes de P.V.C y botas.

RIESGOS AMBIENTALES: Toxicidad para abejas: Altamente tóxico. No aplicar en horario de pecoreo. Evitar la salida de las abejas de la colmena, sino se pueden trasladar cubrir con arpillera húmeda. Hacer aplicaciones temprano a la mañana o nocturnas. Si no puede evitarse su aplicación durante la floración, se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de aplicación, por lo menos a 4 km, a partir del límite tratado y por un período no menor a 30 días. Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico para aves. Toxicidad para peces: Moderadamente tóxico. No contaminar fuentes o cursos de agua. No asperjar sobre espejos de agua, no eliminar caldos remanentes o enjuagar/lavar equipo de aplicación en fuentes de agua. Establecer una franja de 50 metros entre cultivo tratado y la fuente de agua. Evitar la deriva.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Si el producto no fuera usado en su totalidad, guardar el remanente en su envase original en su envase original herméticamente cerrado y en lugar seguro. No trasvasar a otro recipiente.

El producto remanente en el tanque de la pulverizadora puede diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo existente. Se puede volver a aplicar este nuevo preparado sobre el cultivo ya tratado, sin riesgo para los cultivos recomendados, o bien sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas ni pastoreadas, evitando los riesgos para cultivos siguientes. Las áreas no cultivadas deben estar alejadas de centros poblados y tránsito frecuente de personas.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Verificar que estén totalmente vacíos, practicar la técnica del triple lavado e inutilizarlos por rotura. Posteriormente disponerlos en un lugar seguro y transitorio para entregarlos a un servicio especializado de recolección de residuos de plaguicidas y/o envases vacíos. No incinerar a cielo abierto.

ALMACENAMIENTO: Consérvese en su envase original cerrado herméticamente, en lugar seco y fresco; con buena ventilación y lejos de alimentos, medicamentos y forrajes.

DERRAMES: Inactivar con cal o soda cáustica, luego absorber con aserrín, tierra o arena. Barrer el residuo y colocarlo en recipientes rotulados para su posterior eliminación en plantas de tratamiento autorizadas. Lavar el área con agua amoniacal o detergente.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con la piel, retirar las ropas y lavar la zona con abundante agua limpia y jabón. En el caso de contacto ocular se deben lavar bien los ojos con agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados bien abiertos. En caso de ingestión no se debe provocar el vómito y trasladar al accidentado al hospital más cercano. Se recomienda llevar el envase o la etiqueta del producto al médico.

En todos los casos procurar asistencia médica.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO. CLASE III. CATEGORÍA INHALATORIA III (CUIDADO).

LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) CATEGORÍA IV. SEVERO IRRITANTE OCULAR (PRECAUCION) CATEGORÍA II: Causa daño temporal a los ojos.

No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático. Grupo químico: Biológico.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: irritación ocular leve temporal, convulsiones, ataxia, depresión, temblor, letargo y dilatación de pupilas.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

CAPITAL FEDERAL: Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247 Conmutador: 4962-9280 / 9212, Centro Toxicológico del Htal de Clínicas J. de San Martín: Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806.

BUENOS AIRES: Haedo, Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas: Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777, Conmutador: 4658-5001 al 19 (int. 1102/03). CORDOBA: Hospital de Niños: Corrientes 643 Tel: (0351) 421-5303.

ROSARIO: Hospital de Niños de Rosario: Tel: (0341) 430-3533 ó 481-3611/3612, T.A.S. CASAFE: (0341) 448-0077 ó 424-2727.

MENDOZA: Hospital Central: Tel: (0261) 423-4913.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No se ha establecido la ocurrencia de procesos de potenciación, sinergismo o aditividad en mezclas con otros insecticidas.

CÍTRICOS	Ácaro del tostado (Phyllocoptruta oleivora) Ácaro blanco (Polyphagotarsonus mullatus)	15 - 20 cc/hl + 0,25 % aceite mineral de verano		Aplicar después de la floración, cuando observe los primeros ácaros sobre frutos pequeños formados (menores de 2 cm de diámetro). Repetir cuando ocurran nuevas reinfestaciones. Aplicar cuando se observen los primeros ácaros.
	Ácaro de la yema (Aceria sheldoni)	20 cc/hl + 0,25-0,5 % de aceite mineral de verano		Pulverizar al hincharse las yemas. No aplicar durante la floración.
	Minadores de las hojas (Phyllocnistis citrella)	100 cc/hl + 0,5 % aceite mineral de verano		Aplicar al observar las primeras larvas en brotes tiernos morados recién formados (3-5 cm longitud).
FLORES (CLAVEL, ROSALES Y CRISANTEMOS) Y ORNAMENTALES	Arañuela roja (Tetranychus spp.)	25 - 50 cc/hl	560 - 1500 cc/ha	Aplicar a los primeros indicios de infestación, con alto volumen de agua, alta presión logrando una buena cobertura de todo el follaje.
	Minadores de hoja (Liriomyza sp.)			Pulverizar para proteger los brotes nuevos y repetir cada siete días si es necesario.
FRUTILLA	Arañuela roja común (Tetranychus telarius)	80 - 100 cc/hl	600 - 1200 cc/ha	Aplicar a los primeros indicios de infestación, con alto volumen de agua y alta presión. Asegúrese de mojar toda la planta, pero evite el escurrimiento. Para lograr un buen control se recomienda repetir la aplicación entre los 7 y 10 días de la primera aplicación. No tratar más de 4 veces por ciclo de cultivo.
PAPA	Mosca minadora (Liriomyza sp.)		500 - 750 cc/ha	Aplicar en presencia de las primeras galerías en la parte inferior de la planta. Usar las dosis más altas en caso de haber daño manifiesto. Se recomienda usar equipos de alto volumen mojando perfectamente toda la planta, pero evitar el escurrimiento excesivo.
PERAL	Arañuela Roja Europea (Panonychus ulmi) Arañuela parda (Bryobia rubrioculus) Arañuela Roja común (Tetranychus telarius)	40-50 cc/hl + 0,25% aceite mineral de verano		Iniciar las aplicaciones al determinar 1 ó 2 arañas por hoja. Repetir las aplicaciones de ser necesario. En altas infestaciones y/o a mayor densidad de follaje, usar las dosis más altas. No aplicar más de 3 litros/ha de producto por época de cultivo.
	Psílido del Peral (Psylla pyricola)	75 cc/hl + 0.25% aceite mineral de verano	750 – 1500 cc/ha de acuerdo al volumen de agua a asperjar	Iniciar las aplicaciones al re-contar, en promedio, 1 o 2 ninfas por brote terminal o cuando aparezca la melaza típica después de la floración. En altas infestaciones y/o a mayor densidad de follaje, usar las dosis más altas. No aplicar más de 3 litros/ha de producto por época de cultivo.
PIMIENTO	Arañuela roja común (Tetranychus telarius)	50 -70 cc/hl	500 - 1200 cc/ha de acuerdo al volumen de agua a asperjar	Aplicar al observar los primeros indicios de presencia de las arañas, con un alto volumen de agua y alta presión. Pulverizar todo el follaje pero evitar el escurrimiento. Repetir de ser necesario. No efectuar más de 4 aplicaciones por ciclo de cultivo.
SOJA	Arañuela roja común (Tetranychus urticae)		200 cc/ha	Aplicar a la aparición de los primeros síntomas, cuando se detecten más de 5 ninfas por hoja trifoliada.

RESTRICCIONES DE USO:

PERÍODOS DE CARENANCIA: Período entre la última aplicación y la cosecha: Tomate: 2 días; Apio, melón, sandía, pimiento, pepino y frutilla: 3 días; cítricos: 7 días; pera y manzana: 14 días; soja: 15 días; algodón: 20 días; papa: 30 días. Florales y ornamentales: sin restricciones.

En caso que el producto o sus subproductos se destinen a la exportación deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período máximo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Tiempo de reingreso al área tratada: Reingresar al área tratada una vez transcurridas 24 hs de la última aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los insecticidas de uso común. Sin embargo, es recomendable realizar pruebas de compatibilidad antes de efectuar mezclas con otros productos.

FITOTOXICIDAD: No presenta en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.