



Icaro FULL 5 Litros / PANTONE Black C / PANTONE Reflex C / PANTONE 293 C / PANTONE 199 C

MODO DE ACCIÓN: ICARO FULL es un fungicida preventivo y curativo, con un amplio espectro de acción. Perteneciente al grupo de los triazoles que actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol de los hongos. Tiene acción sistémica y se caracteriza por su rápida velocidad de acción.

MECANISMO DE ACCIÓN: El Cyproconazole inhibe la desmetilación 14 α (subgrupo DMI) de fungicidas EBI) que bloquea la citocromo-oxidasa P-450, la enzima que hidroxila el grupo 14 α -metilo y detiene el desarrollo de hongos al interferir con la biosíntesis de las membranas celulares.

MODO DE EMPLEO: Agitar bien antes de abrir el envase. Se aplica diluido en agua en pulverización sobre el cultivo. Agregar la cantidad calculada de producto al tanque del equipo aplicador a medio llenar, con el sistema de agitación en funcionamiento, y completar luego el tanque con agua. El producto preparado debe ser utilizado antes de las 24 horas. Si queda en reposo durante varias horas, es necesario hacer funcionar el agitador o retorno durante algunos minutos, antes de recomenzar la aplicación. Aplicar con equipo terrestre calibrado de forma de lograr una adecuada cobertura.

Aplicar con equipos terrestre o aéreo calibrado, de forma de lograr una adecuada cobertura. En aplicaciones terrestres utilizar boquillas como hueco, con una presión de trabajo de 40 a 60 psi y un volumen de 100 a 200 L/ha.

No aplicar con vientos superiores a 10 km/h ni en condiciones de estrés hídrico, temperatura máxima 30°C, humedad relativa del ambiente mínima de 60%.

CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO

RECOMENDACIONES DE USO:				
CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (mL/ha)	PC	LMR (mg/kg)
Soya (<i>Glycine max</i> L.)	Roya asiática (<i>Phakopsora pachyrhizi</i>)	120 y 150	21 días	Cyproconazole 0.07

NÚMERO Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

1. Se recomienda la aplicación del fungicida sistémico ICARO FULL a razón de 120 mL/ha para el control de Roya (*Phakopsora pachyrhizi*), en etapa reproductiva (R1-R6), con los primeros síntomas de la enfermedad en cultivo de soya (*Glycine max* L.).

2. Se recomienda la aplicación del fungicida sistémico ICARO FULL a razón de 150 mL/ha para el control de Roya (*Phakopsora pachyrhizi*), en etapa reproductiva (R1-R6), con síntomas entre 1 a 2 % de la enfermedad en cultivo de soya (*Glycine max* L.).

FECHA DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas.

COMPATIBILIDAD: Si la compatibilidad con otro producto es desconocida o se tienen dudas al respecto, se deberá realizar previo a la mezcla un test de compatibilidad físico-químico y se deberá efectuar una prueba de aplicación a pequeña escala, con el objetivo de descartar un posible efecto de fitotoxicidad o interacción no deseada entre los productos, a raíz de dicha mezcla.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos, dosis y recomendaciones indicadas en la etiqueta.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE LA RESISTENCIA: Si son necesarias aplicaciones consecutivas para el control de la enfermedad objetivo se recomienda alternar con otro fungicida con un modo de acción o grupo diferente. El activo de ICARO FULL pertenece al siguiente grupo.

FRAC Código 3 FUNGICIDA

RESPONSABILIDAD LEGAL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las recomendaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA 4 – LIGERAMENTE PELIGROSO



"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO

CUIDADO, EVITE EL CONTACTO, POSIBLE CARCINOGENO
CUIDADO, EVITE EL CONTACTO, POSIBLE TERATOGENICO

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Protección respiratoria: usar respirador de vapor orgánico tipo cartucho con filtro intercambiable. Protección de los ojos: utilice gafas protectoras de acetato o PVC. Protección de las manos: utilice guantes resistentes a químicos de caucho, nitrilo o neopreno. Protección de la piel y el cuerpo: usar traje completo con capucha, delantal impermeable de PVC, nitrilo o neopreno. Usar botas impermeables. **RELATIVO A LA SEGURIDAD:** Este producto puede ser mortal si se ingiere. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (24 horas) utilice el Equipo de Protección Personal. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

• **ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA HUMANOS Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN.**

• **EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑO A LA SALUD Y AMBIENTE.**

• **NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.**

• **NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR, CONJUNTAMENTE CON LOS ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS NI FORRAJES.**

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación de ojos, piel y mucosas, contracción de pupilas, alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómito, dolor abdominal, cefalea, fiebre, fasciculaciones musculares, alteraciones respiratorias, dolor de cabeza y disnea de esfuerzo.

GRUPO QUÍMICO: Cyproconazole: Triazol.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de INHALACIÓN: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado. En caso de CONTACTO CON LA PIEL: quitar inmediatamente la ropa contaminada y lavar las áreas de la piel afectadas con abundante agua y jabón. En caso de CONTACTO CON LOS OJOS: lávese inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. En caso de INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO. Acuda inmediatamente al centro de salud más cercano.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL 800-10-6966, CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS, SANTA CRUZ - BOLIVIA.

TÉLEFONO DEL TITULAR DE REGISTRO:(591) 346-9338.

TRATAMIENTO MÉDICO: Se debe suministrar tratamiento sintomático y terapia complementaria manteniendo al paciente bajo observaciones.

ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico.

RELATIVO A LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el centro o punto de acopio más próximo para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: Producto es Moderadamente tóxico para aves. Ligeramente tóxico para peces e invertebrados acuáticos. Prácticamente no tóxico en abejas.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.

En caso de derrame del producto cubrir con material absorbente (arena, tierra, etc), recoger y colocar en un recipiente cerrado e identificado para su posterior disposición final.



Medidas: 13,5 cm x 12,5 cm

Icaro FULL

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA – SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Cyproconazole 400 g/L
Ingredientes Inertes 710 g/L

USO AGRÍCOLA

ALTO, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

Registro en Bolivia SENASAG N° 5415



Titular de Registro:
PROQUIMUR LTDA
Calle James Joyce # 5040
Zona los Tusequis UV 071 MZA 023,
Telf.: 3469338
e-mail: ruth.torreon@proquimur.uy
Santa Cruz-Bolivia

Fecha de formulación: VER EN EL
Fecha de vencimiento: HOMBRO
Lote N°: DEL ENVASE

Formulado por:
PROQUIMUR S.A.
Dir.: Ruta 5 Km 35,300 - Juanicó,
Departamento de Canelones.
Teléfono: (598) 4335 9662
Email: administracion@proquimur.uy
ORIGEN: URUGUAY

CONTENIDO NETO:

5 Litros

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA
MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS



ATENCIÓN

