

CURASEMILLA INSECTICIDA

CURASEMILLA Lider30sc

SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS

| Ingrediente activo (ISO) | Porcentaje en peso (% p/p) | Contenido en volumen (g/l) |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| TIODICARB | 27 | 300 |

Grupo químico: **CARBAMATO**

Venta autorizada por el M.G.A.P. I Registro: 2929

USO AGRÍCOLA.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: CLASE II (DOS) IPCS/OMS, 2009 MODERADAMENTE PELIGROSO.

ANTÍDOTO: Sulfato de atropina al 1‰ (uno por mil).

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión: provocar el vómito, introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. No provocar el vómito si la persona está inconsciente. **Contacto con los ojos:** lavado a chorro con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. **Contacto con la piel:** lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volverlas a usar. **En caso de inhalación:** retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono (2) 1722 y concurrir al médico llevando esta etiqueta y el envase o folleto acompañante.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES DOMÉSTICOS, DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEF: (2) 1722”.

“CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE”.

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS O VESTIMENTAS”.

“NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”.

CONTENIDO NETO:

Ver en el envase.

ORIGEN: URUGUAY

Nº LOTE:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

VER EN EL HOMBRO DEL ENVASE

FIRMA REGISTRANTE:

INEPLUS S.A.

Treinta y Tres 631.

Canelones, Canelones, Uruguay.

Teléfono: (4332) 8438

Fax: (4332) 3085

NOMBRE DEL FABRICANTE O FORMULADOR:

PROQUIMUR S.A.

Ruta 5 Km 35,300 Juanicó, Canelones, Uruguay

Tel.: (+598) 4335 9662

administracionjuanico@proquimur.com.uy

www.proquimur.com.uy



NOCIVO



101

PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.

No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A ORGANISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEJAS: No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.

No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto.

Toxicidad para aves: PRACTICAMENTE NO TÓXICO.

Toxicidad para peces: MODERADAMENTE TÓXICO.

Toxicidad para abejas: MODERADAMENTE TÓXICO.

Pero por la forma en que se aplica (tratamiento de las semillas) no representa riesgo.

“Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar”.

NO DEJAR SEMILLA TRATADA CON ESTE PRODUCTO EXPUESTA A SER CONSUMIDA POR ANIMALES DOMESTICOS O SILVESTRES PRINCIPALMENTE AVES.

DISPOSICIÓN FINAL DE ENVASES: Una vez vaciado el contenido del envase haga el “Triple lavado” del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalado con un cartel que indique “Cuidado-veneno (calavera)”.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES DOMÉSTICOS, DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEF: (2) 1722”.

“CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE”.

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS O VESTIMENTAS”.

“NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”.

“PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA”.

“PROHIBIDO SU USO PARA TRATAR GRANOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN HUMANA O ANIMAL O PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN. El lavado no elimina el tóxico de la semilla tratada”.

RECOMENDACIONES DE USO:

GENERALIDADES, MODO DE ACCIÓN SOBRE LA PLAGA O EL CULTIVO: CURASEMILLA LIDER 30 SC es un curasemilla de baja toxicidad, sistémico y de contacto, que controla los insectos plaga del suelo indicados en esta etiqueta.

| INSTRUCCIONES DE USO: | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS (lts/100 Kg de semilla) |
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | |
| MAÍZ | Lagarta elasmó | <i>Elasmopalpus lignosellus</i> | 2 |
| | Lagarta cortadora | <i>Agrotis ipsilon</i> | |
| | Lagarta cogollera | <i>Spodoptera frugiperda</i> | |
| TRIGO | Bicho torito | <i>Diloboderus abderus</i> | 0,2 |
| GIRASOL | Lagarta cortadora | <i>Agrotis ipsilon</i> | 2 |
| | Lagarta del girasol | <i>Rachiplusia nu</i> | |

MOMENTO(S) DE APLICACIÓN: PARA CADA COMBINACIÓN: Se aplica a la semilla previo a la siembra.

NÚMERO, FRECUENCIA, Ó ESPACIAMIENTO DE APLICACIONES SI CORRESPONDE: Una sola aplicación.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

TIEMPO DE ESPERA: No corresponde por el modo de aplicación.

TIEMPO DE REINGRESO AL CULTIVO: No corresponde por el modo de aplicación.

OTRAS INFORMACIONES NECESARIAS RESPECTO AL USO MODO DE PREPARACIÓN Y TÉCNICA DE APLICACIÓN:

Se aplica directamente a la semilla y diluido en una cantidad suficiente de agua de tal forma de hacer una correcta distribución del producto. No utilizar más de 1.5 litros de dilución total (producto + agua) por cada 100 Kg de semilla.

Se recomienda el uso de equipos especializados para tratamiento de semillas por el sistema en húmedo o slurry, asegurándose una correcta cobertura en toda la semilla. Agitar antes de usar. Preparar únicamente lo estimado para el día.

Si el preparado queda en reposo durante varias horas, es necesario hacer funcionar el agitador o retorno durante algunos minutos, antes de recomenzar la aplicación.

No efectuar el llenado de la maquinaria de aplicación con agua directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.

NOTA: Como el uso, manejo y almacenamiento de este producto, se realiza fuera del control de esta firma, ésta no se hace responsable por daños y perjuicios que puedan derivarse del empleo o almacenamiento de este material. Quedando por entendido, que el comprador ha aceptado estas condiciones.